

REYNOUTRIA JAPONICA Houtt - pohánkovec japonský

Čeľad': *Polygonaceae* Juss. - stavikrvovité

Rozšírenie: Juhovýchodná Ázia (Čína, Kórea, Japonsko), do Európy dovezená v prvej polovici 19. storočia. Dnes rastie predovšetkým v severnej a strednej Európe. U nás sa vyskytuje na celom území od nížin do podhorského stupňa.

Ekológia: Pohánkovec je u nás často pestovaný ako dekoratívna rastlina v parkoch a záhradách, odkiaľ sa divo rozširuje. Dnes patrí medzi významné invázne druhy, šíri sa veľmi často a rýchlo, hlavne pozdĺž vodných tokov, komunikácii a na rumoviskách. Rozmnožuje sa predovšetkým vegetatívne. Uprednostňuje kyslé a vlhké pôdy.

Popis: Statná, vytrvalá 1,5–2 m vysoká, dvojdomá bylina. Byľ je priama, oblá, dutá, dužinatá, lysá alebo mierne papilkatá. Listy striedavé, stopkaté, stopka je 1,5 až 3 cm dlhá, čepeľ vajcovitá až široko vajcovitá, 10–17 cm dlhá a 8–12 cm široká, na vrchole špicatá, na báze ut'atá alebo tupo klinovitá, celo okrajová, lysá. Kvetenstvom je metlina mnohokvetých nepravých klasov vyrastajúcich z úžľabí listov, dlhšie ako stopka príslušného listu. Kvety pravidelné, päťpočetné, 7–10 mm v priemere, okvetie nerozlíšené na kalich a korunu, okvetné lístky biele. Plodom je nažka. Kvitne od júla do septembra.

Nebezpečnosť: Rastlina patrí medzi invázne buriny a je veľmi nebezpečná.

Poznámka: Rod bol pomenovaný na počesť flámskeho mecenáša botaniky [Karla van Sint Omaars](#) (van Reynoutre).

Zdroj: <http://botany.cz/cs/reynoutria-japonica/>



Dried Leaf

http://projects.exeter.ac.uk/knotweed/key_descriptors.htm



1557057

<http://www.invasive.org/images/768x512/1557057.jpg>



UGAS205100

<http://www.invasive.org/images/768x512/5205100.jpg>

Pohánkovec japonský - Fallopia japonica

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Japanese_quizendknoopjonge_scheuten_%28Fallopia_japonica%29.jpg