

REYNOUTRIA SACHALINENSIS (F. Schmidt) Nakai - pohánkovec sachalínsky

Čeľad': *Polygonaceae* Juss. - stavikrvovité

Rozšírenie: Pôvodný na Ďalekom východe, konkrétne na ruskom ostrove Sachalin, na Kurilských ostrovoch a na japonských ostrovoch Hokkaidó a Honšú. Do Európy bol ako okrasná rastlina dovezený v druhej polovici 19. storočia, konkrétne do botanickej záhrady v Petrohrade, odkiaľ bol distribuovaný ďalej. V súčasnosti sa vyskytuje ako vysoko invázny a značne nebezpečný druh v rade krajín Európy aj Severnej Ameriky, bol zaznamenaný aj v juhovýchodnej Austrálii a na Novom Zélande.


Ekológia: Na Ďalekom východe rastie na brehoch riek a potokov, u nás využíva ku svojmu šíreniu vodné toky taktiež, objavuje sa aj v okolí ľudských sídiel. Šíri sa aj na prirodzené stanovištia, kde vytvára veľmi husté porasty, ktoré vytláčajú všetku pôvodnú vegetáciu.

Popis: Vytrvalá dvojdomá bylina, 2–4 m vysoká, byle sú priame, duté, v hornej časti rozvetvené, lysé. Listy stopkaté, celo okrajové, podlhovasto vajcovité až vajcovité, na vrchole špicaté, na báze srdcovité, až 35 cm dlhé a 10–20 cm široké. Drobné kvety sú zelenobiele až nažltlo sfarbené a usporiadané v nepravých klasoch až 6 cm dlhých. Kvitne od júla do septembra. Plodom je 3hranná nažka.

Nebezpečnosť: Rastlina patrí medzi invázne buriny a je veľmi nebezpečná.

Poznámka: Rod bol pomenovaný na počesť flámskeho mecenáša botaniky [Karla van Sint Omaars](#) (van Reynoutre).

Zdroj: <http://botany.cz/cs/reynoutria-sachalinensis/>



http://projects.exeter.ac.uk/knotweed/key_descriptors.htm

http://farm4.static.flickr.com/3157/2555365857_fb1f6c1f18.jpg?v=1212787140



http://farm3.static.flickr.com/2042/1690595558_b79d05b385.jpg?v=0

Pohánkovec sachalínský - Fallopia sachalinensis

<http://eundeskreis-wolfsbrunn.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/knoterich-495.jpg>