

DIPSACUS LACINIATUS L. - štetka laločnatá

Čeľad: *Dipsacaceae* Juss. - šetkovité

Rozšírenie: Južná a stredná Európa - na severe po severné Nemecko a severné Poľsko, južné Rusko, Kaukaz, Malá Ázia, Irán, Stredná Ázia. Zavlečená aj do Severnej Ameriky. U nás rastie roztrúsene v teplejších oblastiach.

Ekológia: Rastie na lúkach a pastvinách, násypoch, okolo ciest, na hrádzach vodných plôch aj na rumoviskách, v pásme od nížin do pahorkatín.

Popis: Dvojročná bylina, 80–150(–200) cm vysoká, byľ priama, hore vetvená, ostnatá, obrátene vajcovité listy prízemnej ružice za kvetu odumreté, listy na byli perovito laločnaté až perovito strihané, na báze zrastené, v obryse eliptické až kopijovité. Hlávky až 7 cm dlhé, valcovité až vajcovité, listene ostnaté, nanajvýš rovnako dlhé ako hlávka, koruna biela alebo ružovkastá. Kvitne od júla do septembra. Plodom je nažka.

Nebezpečnosť: Vytrvalá burina.

Zdroj: <http://botany.cz/cs/dipsacus-laciniatus/>



<http://extension.missouri.edu/explore/images/ipm1023cutleafteasel.jpg>



http://www.sci.muni.cz/bot_zahr/fotografie/venkovni%20rostliny/Dipsacus%20laciniatus.jpg



<http://www.foto-net.sk/?idp=30579&page=1>



Štetka laločnatá - *Dipsacus laciniatus*

<http://biology.missouri-state.edu/Herbarium/Plants%20of%20the%20Interior%20Highlands/Flowers/Dipsacus%20laciniatus%20%201.JPG>