

RUMEX ACETOSELLA – štiav menší

Čeľad: *Polygonaceae* - stavikrvovité


Rozšírenie: Rastie v Európe, na Sibíri, na Ďalekom východe, v Japonsku, v južnom Grónsku, na severe Afriky, druhotne takmer na celom svete.

Ekológia: Suché lúky, na živiny chudobné trávniky, polia, vychodené cesty, popri skalách, piesčiny, na pôdach nevýživných, nevápnitých, piesčitých, kyslých, suchých.

Popis: Vytrvalá, dvojdomá, 10 až 40 cm vysoká bylina. Byľ zväčša priama, často s červeným nádychom. Listy čiarkovité, kopijovité, obrátene kopijovité alebo vajcovité, na báze oštepovité alebo šípovité, lalokov niekedy aj viac, stopkaté, často s červeným nádychom. Kvety jednopohlavné, červené, usporiadané do štíhlej metliny, krovky malé, sotva kryjúce plod, žltohnedé až hnedé. Kvitne v máji až júli.

Nebezpečnosť: Vytrvalá burina.

Zdroj: <http://botanika.wendys.cz/kytky/K420.php>



1559263

<http://www.invasive.org/images/768x512/1559263.jpg>



1550213

<http://www.invasive.org/images/768x512/1550213.jpg>



http://farm1.static.flickr.com/52/159736435_9f9b566f17.jpg?v=0

Štiav menší - *Rumex acetosella*

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Star_080301_3105_Rumex_acetosella.jpg