

Stromárka orechová (*Panaphis juglandis*, syn. *Callaphis juglandis*)

Stromárka orechová, ktorej hostiteľskými rastlinami sú druhy z rodu orech (*Juglans*), patrí v podmienkach Slovenskej republiky k bežne rozšíreným voškám. Okrem toho sa vyskytuje aj v ďalších stredných a južných častiach Európy, Malej Ázii a Severnej Amerike.

Vošky na povrchu listov v blízkosti hlavnej, stredovej žilky **vytárajú početné kolónie**. Takmer vždy môžeme v kolónii nájsť okrídlenú živorodú samičku, ktorá má žlté sfarbenie, často s oranžovým odtieňom. Pre samička je typická hnedá hlava a hrud', bruško je žltkasté s tmavšími priečnymi pásmi.



Obr. 1 – Stromárka orechová (*Panaphis juglandis*, syn. *Callaphis juglandis*)

Zdroj: (<https://www.biolib.cz/en/image/id189696/>)

V prípade výskytu stromárky orechovej bývajú listy často znečistené sladkou **medovicou**, ktorú vylučujú kolónie vošiek. S postupom času sa na medovici rozrastajú **mikroskopické tmavé plesne** – černe, ktoré spôsobujú zníženie asimilačnej schopnosti listov. Následkom toho je **zhoršenie vývinu plodov**.

Stromárska orechová sa najintenzívnejšie rozmnožuje v prvej polovici leta, neskôr zo stromov takmer úplne vymizne. **V jesennom období** (október) kladú samičky na letorasty stromov oválne, **zelenkasto sfarbené vajíčka**, ktoré o niekoľko dní začnú tmavnúť. Škodca v štádiu vajíčok na hostiteľskej rastline prezimuje.

Na území Slovenska proti tomuto škodcovi **nie sú autorizované žiadne prípravky** na ochranu rastlín, chemická ochrana sa zvyčajne nerobí. Vo všeobecnosti stromárku orechovú nezaradujeme k vážnejším škodcom.

Ing. Ivana Horváthová

Odbor ochrany rastlín

ÚKSÚP

20.11.2017