

TANACETUM VULGARE L. - vratič obyčajný

Čeľad': *Asteraceae* Martinov - astrovité

Rozšírenie: Európa, mierne pásmo Ázie (až na Ďaleký východ), zavlečený aj do Severnej Ameriky. Pôvodný je pravdepodobne v Stredomorí, odkiaľ sa rozšíril do všetkých súčasných oblastí výskytu. U nás sa vyskytuje vo veľkom množstve až všeobecne, predovšetkým v teplejších oblastiach, v horách ojedinele.

Ekológia: Rastie na okrajoch lesov, na okrajoch ciest, na úhoroch, v lomoch, na železničných násypoch, rumoviskách a brehoch vodných tokov.

Popis: Vytrvalá bylina, 30–120 cm vysoká, byť väčšinou priama, husto olistená, 5hranná, s červeným nádychom, listy striedavé, dolné stopkaté, stredné a horné sediace, pretŕhane perovito strihané, lístky perovito dielne, zubaté. Úbory terčovito sploštené, 25–60 v hustom chocholíkovitom kvetenstve, kvety iba trubičkovité (zriedka okrajové jazykovité), zlatožlté. Kvitne od júla do septembra. Plodom je nažka.

Nebezpečnosť: Vytrvalá burina.

Využitie: Vratič je dobre známou liečivou aj magickou rastlinou, zmienky o jeho účinkoch nájdeme takmer vo všetkých starých herbároch. Kvety slúžili aj ako farbivo na látky, získavala sa z nich farba žltá, zelená a hnedá.

Poznámka: Vratič obyčajný slúži ako živná rastlina pre fúzača *Phytoecia nigricornis*.

Zdroj: <http://botany.cz/cs/tanacetum-vulgare/>



Photo by
Riche J Old
www.xdserv.com UGA5247007

<http://www.invasive.org/images/768x512/5247007.jpg>



http://www.anpc.ab.ca/wiki/images/7/72/Tanavulg_XID_Tanacetum_vulgare_seedling_603.jpg



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Tanacetum vulgare a4853

http://www.hlasek.com/foto/tanacetum_vulgare_a4853.jpg

Vratič obyčajný - *Tanacetum vulgare*

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Tanacetum_vulgare_20041012_2570.jpg