

## Signalizačná správa ÚKSÚP

Počasie je naďalej veľmi ustálené, bez zrážok, našťastie tropické teploty ešte nie sú a aspoň kratšie ochladenia nezvyšujú enormné sucho.

Vo feromónových lapačoch slúžiacich na signalizáciu ochrany proti obalovačom na ovocných stromoch je pozorovaný let prvej generácie: U **obalovača slivkového a broskyňového** (synonymum **obalovač východný**) je badateľný vplyv kolísania teplôt, kedy ochladenia spôsobujú pokles a oteplenia opätovný nárast početnosti ulovených motýľov. Početnosť v rovnakom období je výrazne vyššia ako vlni. V oblastiach s pravidelnými hospodárskymi škodami možno vykonať ochranu aj proti prvej generácii, i keď druhá generácia býva škodlivejšia. Spomedzi povolených prípravkov je jeden biologický, a to Lepinox plus (aj v malospotrebitel'skom balení – MB) proti obalovačovi broskyňovému, ktorý možno použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní po začiatku výraznejšieho náletu. Povolené prípravky.

- obalovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebitel'skom balení Samuraj,
- obalovač slivkový – Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delta EW 50 a Dinastia a iba v malospotrebitel'skom balení Decis Al, a ďalej Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebitel'skom balení Samuraj, ktoré sú autorizované proti húseniciam všeobecne.

Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je uvedené v nasledovnej tabuľke:

územie Slovenskej republiky	obalovač broskyňový	obalovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)	19.-21. mája	22.-25. mája
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)	23.-25. mája	26.-29. mája
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)	29. mája- 2.júna	1.-5 júna
polohy nad 600 m	ešte plus 5-7 dní	

Z ostatných chorôb a škodcov upozorňujeme na **méru hruškovú** na hruškách, **múčnatku** na jadrovinách, najmä jabloniach, **americkú múčnatku egreša** na egreši a **pásavku zemiakovú**, ktorej dospelce, prípadne larvy sa začínajú objavovať v porastoch zemiakov.

Ing. Stanislav Barok  
ÚKSÚP – OOR  
11.5.2020