

Signalizačná správa ÚKSÚP

Teplé letné počasie s lokálnymi zrážkami búrkového rázu naďalej pretrváva, čo vyhovuje najmä hubovým chorobám. Pre škodcov nie je takéto počasie úplne ideálne.

Prvá polovica júla je obdobím rojenia **obaľovača jablčného**. Pre určenie termínu ošetrovania odporúčame sledovať aj odchyt dospelcov feromónovými lapačmi, ktorý je zverejňovaný na stránke <https://www.uksup.sk/nalety-obalovacov> pre 16 lokalít Slovenska. Po najbližšom vrchole letu je potrebné počítať dni na vykonanie ošetrenia, pričom prípravky uvádzané v tabuľke pre 1. termín ošetrovania treba aplikovať ihneď po vyvrcholení letovej vlny motýľov alebo po nájdení prvých vajíčok v sade. Sú vysoko účinné a druhé ošetrenie pri nich nie je potrebné. Biologické prípravky sa aplikujú tesne, t.j. 1-2 dni pred liahnutím húseníc alebo 3 dni po vyvrcholení letovej vlny motýľov. To však predpokladá kontrolu stavu vajíčok v sade (tesne pred liahnutím sú vajíčka v štádiu tzv. čiernej hlavičky). Ostatné prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc, t.j. 8 dní po vyvrcholení letovej vlny motýľov (v tabuľke 2. termín). Z tejto skupiny prípravkov odporúčame vyberať tie, ktoré nemajú iba kontaktný účinok. Orientačné obdobia ošetrovania sú nasledovné:

územie Slovenskej republiky	1. termín	2. termín
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)	9.-11. júla	17.-19. júla
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce):	13.-16. júla	20.-25. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m): polohy nad 600 m	19.-25. júla	26. júla-4. augusta
	ešte plus 5-7 dní	

Prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:

- buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Coragen 20 SC, Vesticor alebo Integro (aj v malospotrebiteľskom balení – MB),
- alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam Bulldock 25 EC, Green Bull, Cyprin 10 EC, Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delta EW 50, Dinastia, Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambdol, Mavrik (aj MB), Evure, Calypso 480 SC, Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Carnadine, Spintor (aj MB), Explicit Plus a Steward a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al a Samuraj,
- alebo biologické prípravky Biobit XL, Lepinox Plus (aj MB), Carpovirusine, Madex a Madex Top, ktoré sa aplikujú približne 3 dni po 1. termíne.

Ešte upozorňujeme na **pleseň uhorkovú**, pre ktorú sú vcelku priaznivé podmienky pre vývoj a škodlivosť.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
2.7.2020