

Signalizačná správa ÚKSÚP

Ustálené počasie naďalej praje škodcom. V dnešnej správe sa zameriame na obaľovače na kôstkovinách.

Prelom júna a júla je pravidelným časom rojenia **obaľovača slivkového a broskyňového** (synonymum **obaľovač východný**). Vysoké teploty spôsobili rýchlejší vývoj, preto posun termínov oproti priemeru je už nižší ako tomu bolo pri prvej generácii. Spomedzi povolených prípravkov je jeden biologický, a to Lepinox plus s účinnou látkou Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (aj v malospotrebitel'skom balení – MB) proti obaľovačovi broskyňovému, ktorý možno použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. V rovnakom termíne sa aplikuje aj Steward OPZ (účinná látka indoxacarb). Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní po začiatku výraznejšieho náletu. Povolené prípravky.

- obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebitel'skom balení Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin),
- obaľovač slivkový – Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delta EW 50 a Dinastia a iba v malospotrebitel'skom balení Decis AI (všetky s účinnou látkou deltamethrin), a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB) a Lambdol a iba v malospotrebitel'skom balení Samuraj, ktoré sú autorizované proti cicavým a žravým škodcom a húseniciam všeobecne, teda ich možno použiť aj proti obaľovačovi broskyňovému.

Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je uvedené v nasledovnej tabuľke:

územie Slovenskej republiky	obaľovač broskyňový	obaľovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)	8.-10. júla	12.-14. júla
2. signalizačné pásmo (ohraničeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)	11.-13. júla	15.-19. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)	18.-21. júla	21.-27. júla
polohy nad 600 m	-	ešte plus 5-7 dní

Z ostatných chorôb a škodcov upozorňujeme na **méru hruškovú** na hruškách a **múčnatku a chrastavitosť** na jadrovinách, najmä jabloniach. **Vinohradníkom** pripomíname potrebu ochrany proti **múčnatke** po odkvitnutí paušálne vo všetkých oblastiach, nakoľko pre ňu pretrvávajú minimálne 4 týždne vhodné podmienky.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
28.6.2021