

Signalizácia

Vinič napriek premenlivému počasiu začína pučať. Nastáva teda vhodný čas na ošetrovanie **proti kučeravosti, tzv. postrekom „na sucho“**. Chemickú ochranu je potrebné vykonať vo vinohradoch, kde roztoče v minulom roku spôsobili viditeľné škody, ako aj tam, kde sa nevyužíva biologická ochrana. Naopak, v zdravých viniciach ošetrovanie nie je potrebné. Zároveň chceme zdôrazniť, že **plstnatosť** (erinóza) nemá hospodársky význam a **kučeravosť** (akarinóza) predstavuje najmä lokálny problém silne infikovaných krov viniča. V rámci ochranných opatrení sa odporúča silne napadnuté kry (opakované napadnutie počas viacerých rokov) mechanicky odstrániť a spáliť.

Jarný postrek je najúčinnější počas slnečných dní pri teplote približne 12 – 15°C. Na chemickú ochranu možno využiť Kumulus WG a Thiovit Jet (účinná látka síra, dostupné aj v malospotrebiteľskom balení – MB), ktoré sa odporúča aplikovať v štádiu tesne pred rašením viniča.

Biologická ochrana prostredníctvom dravého roztoča *Typhlodromus pyri* sa považuje za najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany životného prostredia. Treba však zohľadniť vyššie vstupné náklady na realizáciu tohto opatrenia. Pri dodržaní podmienok jeho použitia a správnom výbere ďalších prípravkov počas vegetácie proti hubovým chorobám a iným škodlivým organizmom, ktoré nezničia populácie dravého roztoča, je možné zabezpečiť dlhodobú ochranu vinohradu počas celej jeho životnosti.

Na záver by sme chceli reagovať na častú otázku, či tento jarný postrek pôsobí aj proti múčnatke viniča. Oficiálne povolenie/autorizácia nie je uvedené pri žiadnom prípravku v tomto skorom štádiu ošetrovania a o vedľajšom účinku tiež nie sú na etiketách prípravkov žiadne údaje. Keďže ide o prípravky na báze síry, možno predpokladať určitý, avšak nižší účinok aj proti múčnatke. Za dostatočný protimúčnatkový účinok sa považuje až ošetrenie v štádiu, keď letorasty dosahujú dĺžku približne 10 – 15 cm.

Pre **jablone a hrušky** je potrebné zdôrazniť význam prvého ošetrenia, ktorým je **predjarný postrek**. Ten by sa mal vykonať v období, keď už nehrozia silnejšie mrazy, spravidla po dlhšom súvislom oteplení, keď dochádza k aktivizácii prezimujúcich škodlivých organizmov. Pre dosiahnutie dostatočnej účinnosti je vhodná teplota minimálne 10°C, pričom spoľahlivejší účinok možno očakávať pri teplotách nad 15°C. Ošetrenie sa vykonáva od pokročilého štádia tzv. „myšieho uška“ až do fázy ružového kvetného púčika.

Špeciálne prípravky určené na predjarný postrek nie sú povolené. Pri vyšších teplotách a pokročilejšom štádiu pučania hostiteľských rastlín je však možné použiť insekticídy s účinnou látkou lambda-cyhalothrin - Karate Zeon 5 CS (aj v MB), Karate Zeon 050 CS, Karathe Zeon 5CS, Kusti, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel, Vaztak Pro a Samuraj, ktorý je iba v MB. Alternatívou sú prípravky s účinnou látkou cyantraniliprole – Irazu a Exirel (aj v MB), ktoré sa aplikujú po odkvitnutí. Uvedené prípravky sú autorizované proti kvetovke jabloňovej a v niektorých prípadoch aj proti húseniciam. Pre zvýšenie účinnosti ošetrenia sa odporúča použiť vyšší objem postrekovej kvapaliny (približne 1 000 l/ha). Predjarný postrek sa vykonáva iba raz.

Na **hruškách** patrí medzi významných škodcov **méra hrušková**, proti ktorej je v súčasnosti povolené širšie spektrum insekticídov, ktorými sú Beetlon, Gunner, Lambada (účinná látka lambda-cyhalothrin); Harpun (účinná látka pyriproxifen); Aceiro 200 SL, Harakiri, Leptostar 200 SL, Luminis, Tazonit 200 SL, Verdalia (účinná látka acetamiprid); Sivanto Prime (účinná látka flupyradifuron). Pomocný prípravok Mumminet (účinná látka heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom) možno taktiež použiť na ochranu

proti mére ovocnej. Uvedené prípravky sú určené pre profesionálnych používateľov a nie sú dostupné v malospotrebitel'skom balení.

Následnými ošetreniami zameranými na vošky a najmä obal'ovača jablčného možno dosiahnuť aj vedľajší účinok proti méram. Významnú úlohu pri regulácii ich populácie zohrávajú aj prirodzení nepriatelia, ako sú dravé bzdochy, lienky, zlatoočky, ucholaky, mravce a pavúky, ktoré prispievajú k znižovaniu ich početnosti.

Pri použití všetkých menovaných prípravkov je nevyhnutné dodržať pokyny pre aplikáciu uvedené na etikete konkrétneho prípravku na ochranu rastlín!

Ing. Maroš Lučaj
ÚKSÚP – OOR
13.04.2026