

Signalizačná správa ÚKSÚP

Koniec júna až prvá polovica júla je obdobím rojenia druhej generácie **obaľovača jablčného**. Ustálené teplé počasie vyhovuje ideálnemu postupnému nárastu odchýtených motýľov. Po najbližšom vrchole letu je potrebné počítať dni na vykonanie ošetrovania, pričom prípravky uvádzané v tabuľke pre 1. termín ošetrovania treba aplikovať ihneď po vyvrcholení letovej vlny motýľov alebo po nájdení prvých vajíčok v sade. Sú vysoko účinné a druhé ošetrovanie pri nich nie je potrebné. Biologické prípravky sa aplikujú tesne, t.j. 1-2 dni pred liahnutím húseníc alebo 3 dni po vyvrcholení letovej vlny motýľov. To však predpokladá kontrolu stavu vajíčok v sade (tesne pred liahnutím sú vajíčka v štádiu tzv. čiernej hlavičky). Ostatné prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc, t.j. 8 dní po vyvrcholení letovej vlny motýľov (v tabuľke 2. termín). Z tejto skupiny prípravkov odporúčame vybrať tie, ktoré nemajú iba kontaktný účinok. Orientačné obdobia ošetrovania sú nasledovné:

územie Slovenskej republiky	1. termín	2. termín
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)	1.-3. júla	7.-9. júla
2. signalizačné pásmo (ohraničené približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce):	4.-7. júla	11.-16. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m):	10.-16. júla	17.-26. júla
polohy nad 600 m	ešte plus 5-7 dní	

Prehľad v súčasnosti povolených prípravkov:

- buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam Atsina, Coragen 20 SC, Coragen 200 SC, Corragen 20 SC, Cosayr, Chloraprol 20 SC, Chloraprol-I 20 SC, LS Chlorantra 200, Shenzi 200 SC, Suvisio 200 SC, Vesticor a Voliam (všetky s účinnou látkou chlorantraniliprole) a Harpun (účinná látka pyriproxyfen),
- alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Dinastia a v malospotrebiteľskom balení (MB) Sanium Ultra (všetky s účinnou látkou deltamethrin), Karate Zeon 5 CS (aj MB), Karate Zeon 050 CS, Karathe Zeon 5 CS, Kusti, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel, Vaztak Pro a iba v MB balení Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin), Mavrik (aj MB), Evure, Flunat, Flunat-I, Scotia a Tauflo 240 (všetky s účinnou látkou tau-fluvalinate), Accept, Aceiro 200 SL, Acceptir 200 SE, Aceta-I 200 SL, Alphamiprid 20 SP, Apis 200 SE, Aprid 200 SE, Carnadine, Carnadine 200 SL, Gazelle, Harakiri, Kachikoma, Karnadex, Kestrel, Leaxus, Leptostar 200 SL, Luminis, Mospilan 20 SP (aj MB), Neois 200 SE, Roslix, Spyran, Tamer, Tazonit 200 SL a Verdalia (všetky s účinnou látkou acetamiprid), Spintor (aj MB) a Nexsuba (účinná látka spinosad) a Mimic (účinná látka tebufenozide),
- alebo biologické prípravky Dipel DF, Lepido a Lepinox Plus (účinná látka Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, aj MB), Carpovirusine, Carpovirusine Evo2, Carpovirusine Ultra a Madex Top (všetky s účinnou látkou Cydia pomonella Granulovirus), ktoré sa aplikujú približne 3 dni po 1. termíne.
- Isomate CTT je feromónový odparník určený na mätenie samcov, čím sa výrazne obmedzí schopnosť rozmnožovania. Aplikuje sa pred začiatkom náletu prvej generácie obaľovačov.

- Osobitný termín použitia má prípravok Nemapon (*Steinernema feltiae*, aj MB), ktorý sa aplikuje na jeseň, kedy teplota po aplikácii 8 - 10°C má byť aspoň niekoľko hodín. Aplikuje sa na večer, za vlhkého až daždivého počasia. Nemapom aplikujte po zbere, v dobe výskytu škodcu vo fáze lariev v diapauze.

Z ostatných chorôb a škodcov upozorňujeme najmä na **molice, vošky a múčnatku na viniči**.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
22.6.2026